



Language Czech

Text

Na území Národního parku České Švýcarsko a sousední CHKO Labské písky byl prokázán výtvarný výskyt více než 330 druhů obratlovců. Jsou mezi nimi jak druhy běžné, tak silně a i kriticky ohrožené. Druhově nejpočetnějšími skupinami obratlovců jsou ryby a ptáci.



Ryby a kruhoústá

Z pět vodních druhů kruhoústých se dnes na území Národního parku a CHKO vyskytuje již pouze mihule potoční, která žije v povodí ústí Kámenice a Kamenice. Mihule mořská a mihule říční, které byly zničeny na ústí Labe, patřily již více než 100 let k vymizelým druhům.

Z hlediska druhového bohatství ryb patří k nejvýznamnějším pět vodních toků ústí Labe s typickými představiteli parramou obecnou, candákem obecným, ježdákem obecným, mněkem jednovousým a úhořem říčním. Celkově byl v Labi prokázán výtvarný výskyt 20 pět vodních druhů ryb. Ostatní toky v této oblasti nily ležící výtvarnou k pstruhovému pětismu s charakteristickými druhy pstruhem obecným, lipanem podhorním a vrankou obecnou. V povodí ústí Jávského potoka žije stěží potoční a měřenka mramorovaná. Od roku 1999 probíhá v povodí ústí Kamenice projekt reintrodukce lososa obecného. Od roku 2002 jsou pravidelně pozorováni dospělí lososi táhnoucí z moře zpět do Kamenice na sv. trdli.

Losos obecný. Foto: Zdeněk Patzelt

[ZPĚT NA ÚVOD](#)



Obojživelníci

V území byla prokázána pětatomnost 16 druhů obojživelníků. Zajímavá je populace [mloka skvrnitého](#), která v některých oblastech dosahuje značné početnosti a svatoho nejnížežního města rozšířená v České republice (cca 150 m n. m.). Ve velmi silné populaci se vyskytuje [olek horský](#) a [olek obecný](#), naopak velmi vzácný je [olek velký](#). Jako rarita je v literatuře uváděn výtvarný výskyt [olka hranatého](#), významného atlantického

elementu. Jen lokálně byla zjištěna **kuřka obecná**. Naopak běžně je **skokan hnědá** a **ropucha hnědá**. Stabilně se vyskytují také **skokan skřehotavý**, **skokan žitěhlavý** a **skokan ostronosý**.



Žolík horský (vlevo nahoře) a žolík obecný (vpravo dole). Foto: Václav Sojka

[ZPĚT NA VOD](#)



Plazi

Historicky byl ve zdejší oblasti prokázán výskyt osmi druhů plazů. **Želva bahenní**, obvykle kdysi slepá; ramena Labe, byla však vyhubena již před více než 100 lety. Také o **uřovce podplamatý** chybě v posledních desetiletích dává o jejím výskytu. V posledních letech přibyla pozorování teplomilného **uřovky hladké**. V okolí vod lze běžně spatřit **uřovku obojkovou**. Poměrně běžně je také **zmije obecná**. Hojně se vyskytují **slepýš**; **křehky** a **jeřábka živorodá**; plošná charakter má; rozdílně **jeřábky obecné**.



Zmije obecná. Foto: Václav Sojka

[ZPĚT NA ĀVOD](#)



Ptáci

Na ĀzemĀ NP ĀeskĀ Ā vĀcarsko a CHKO LabskĀ pĀskovce bylo prokĀzĀno hnĀzdĀnĀ vĀce neĀ 130 druhĀ ptĀkĀ. PravidelnĀ v celĀ oblasti hnĀzdĀ minimĀlnĀ tĀi pĀry [ĀĀpa ĀĀernĀho](#) a od poloviny devadesĀtĀch let opĀt ĀspĀĀnĀ hnĀzdĀ [sokol stĀhovavĀ](#), jehoĀ populace je v souĀasnosti nejvĀtĀ ve stĀednĀ EvropĀ. SkalnatĀ krajina je takĀ domovem pĀvodnĀch divokĀch populacĀ **poĀtolky obecnĀ** a **rorĀse obecnĀho**. BĀĀnĀm obyvatelem se stal **krkavec velkĀ**.



Sokol stĀhovavĀ. Foto: Václav Sojka

Na bĀezĀch Labe vzĀcnĀ hnĀzdnĀ **pisĀk obecnĀ** a **kulĀk ĀĀnĀ**. ZajĀmavĀ je takĀ

prokázáno hnízdění **morčeka velkého** na Labi. Ářeka Labe je také významným zimovištěm a migračním koridorem pro řadu druhů, například **kormoran velkého, volavku popelavou, orlovce černého, racka lohlavého** a **hohola severního**. Říkosiny v okolí rybníků jsou domovem **bukaře velkého, pochopa říkosního** a **labutě velkého**. V roce 2014 bylo na Olešském rybníku prokázáno hnízdění **orla mořského**. Na vlhkých loukách pravidelně hnízdí **bekasna otavní** a **cháňstal vodní**.

Relativně stabilní je populace **ledáčka černá**. Hnízdní hustota populace **skorce vodního** dosahuje na úce Kamenici jedno z nejvyšších ve střední Evropě. V blízkosti tekoucích vod lze běžně pozorovat **konipase horského**.



Ledáček. Foto: Václav Sojka

Hnízdění bylo prokázáno u sedmi druhů sov, například u **vářa velkého, kuláčka nejmenšího, sáve rousného, kalouse uřastého** a **puřtáka obecného**. Běžně v lesích hnízdí dravci **jestřáb lesní, káňan lesní** a **krahujec obecný**. Typickým obyvatelům souvislých lesů je **datel černý**. Vyskytují se zde i další druhy plhavců, například **strakapoud velký, luna zelená** a **luna ředě**. Staré bukové porosty poskytují ideální hnízdiště **holubovi doupáčkovi**. Jehličnaté lesy jsou domovem **káňivky obecné** a **ořeřnáka kropenatého**. V posledních letech je na plochách po lesích po řadě letech pravidelně zjišťován výskyt **lelka lesního**.



Vář velká. Foto: Václav Sojka

V teplejších lokalitách má ¼eme slyšet typickú ½ zpívajúcu **¾luby hajná** a **slavka obecná** ho a v lesných svätlinách veľmi vzácnu i **skávaná lesná**ho. Zemädálskú krajinu je domovom **¾uháka obecná** ho, **brambornáka hnädá** ho a v táto oblasti ojedinele hnädáho **brambornáka černohlavá** ho. Hnädá zde také v;ech päť druhá na;ich pänic, v;etn; vzácne **pänice vla;ská**. Ve vysokostábelných loukách pravideln; hnädá skryt; ¾ijáca **chá;stal polná**. Zemädálskú krajinu je také domovom **káepelky polná**.

U **tetáeva hlu;ce** bylo posledná rozmno¾ovániá dolo¾eno v roce 1983. Také v;skyt **jeá; bka lesná**ho je ji¾ minulostí, by; se po roce 2010 objevilo nákolik nepotvrzených informací o jeho pozorovániá. Postupn; mizá také populace **tetá;vka obecná** ho v;zan; na odlesniá náhorná plo;iny v okolí Dá;ánskáho Sná¾anáká, která v;ak opäť á zará-stáj lesem. K vymizelým druhám zemädálské krajiny bohu¾el patá **koroptev polná**, **áejka chocholatá** a **chocholou; obecná** ½.

Podrobn;á informace o vybraných druhách ptáká naleznete [zde](#).

[ZPÄT NA ÁVOD](#)



Savci

V oblasti bylo zatám historicky zjiááno 62 druhá savcá, z nich¾ v;ak á;st byla vyhubená ji¾ päť nákolika stoletími. K táto druhám patá **los evropská** ½, **koáka divoká**, **medväd hnädá** ½ a také **vlk eurasijská** ½, která se v;ak v posledných letech vracá do oblasti Horná Lu;ice v tásném susedstv; áeskosaskáho á v;carska. Od roku 2013 je v;skyt vlká pro;zániá také v severozápadná á;isti á luknovskáho v;ábá¾ku.

Pravideln; se vyskytuje nap;. **rejsec vodná**. Naopak podstatn; vzácniá je **rejsec áerná** ½. Zde;á oblast poskytuje veľmi vhodná podmánky pro netopáry. Celkem bylo ve zde;á oblasti zjiááno 15 druhá netopárá, nap;. **vrápenec malá** ½, **netopár veľká** ½, **netopár uájatá** ½, **netopár ve;erná**, **netopár rezavá** ½, **netopár hvädavá** ½ aj.



Netopár veľká. Foto: Václav Sojka

Z bohatě zastoupeného řádu hlodavců se od začátku devadesátých let na Labi pravidelně vyskytuje **bobr evropský**. **Hraboák mokřadní** dosahuje v kaňonu Labe nejvyššího výskytu v České republice (cca 125 m n. m.). **Myšice temnopásá** patří na vhodných stanovištích v některých letech dokonce k dominantním druhům. Během léta lze pozorovat **veverku obecnou**, zatímco **zajíc polní** patří dnes již k vzácnějším druhům. Pravidelně se vyskytuje **plch velký** a **plátek láskový**, zatímco populace kriticky ohroženého **plcha zahradního** silně ubývá.



Plch velký. Foto: Zdeněk Patzelt

Stabilní je naopak populace **vydry říční**, která byla zjištěna na všech vhodných tocích větve Labe. V posledních letech byl znovu (a opakovaně) prokázán výskyt **rysa ostrovida**. Od roku 2016 je pravidelně zaznamenán výskyt **vlka obecného**, který se do zdejší oblasti rozšířil ze saského Horní Lužice. K běžným druhům lesních savců patří **jezevec lesní**, **kuna skalní** a **liška obecná**.



Rys ostrovid. Foto: Richard Nagel

Velmi hojně se vyskytují **jelen lesní**, **srnec obecný** a **prase divoké**, jejichž stavy musejí být regulovány pravidelným odlovem. **Kamzák horský** alpského pánvu se v oblasti

vyskytuje od roku 1907, kdy byl vypuštěn do volné přírody. V oblasti přechází také zbytek uměle vytvořené populace **mufloň obecního**. K dalším nepůvodním druhům savců, které se zatím vyskytují spíše sporadicky, patří **norek americký, psík valovitý a psík severní**.

[ZPĚT NA VOD](#)

- 8363 zobrazení

Source URL: <https://www.npcs.cz/obratlovci>