



Language Czech

Text

V¹/₂r velká¹/₂ hnězdě jednou do roka. Jeho houkání v toku lze slyšet od řnora do dubna. Pokud byla vejce krátce po sněníce zničena, je samice schopna snést ještě další nřhradě sněku. V hnězdě se zpravidla objevují 2-3 vejce. Na vejcích sedě v³/₄dy samička, zatímco sameček ji po celou dobu krmě. Zhruba po pěti t¹/₂dnech se vyklubou mláata, která jsou po dobu dalších řesti t¹/₂dnř krměna na hnězdě. Schopně letu jsou pak zhruba po devěti t¹/₂dnech.



Zbarvená obou pohlaví tohoto majestátného ptáka je značně proměnlivá. Základní barvy se pohybují od rezavočerné až po tmavě rezavohnědou, přičemž to jsou světlejší, tmavější horní část těla až do světlejší spodní. U oka a pod zobákem si lze všimnout bílé skvrny. Velikost pera, která tvoří ouška. Má oranžové oči, mláďata jsou lutohnědá; s menšími tmavšími skvrnami oproti rodičům. Samice je větší než samec.

Jeho kořistí jsou zejména hlodavci a drobní savci. Loví vajík i rýžňák ptáky až do velikosti bažanta a troufne si i na jiného dravce. S oblibou loví také ježky.

Největším nepřítelem veverky je člověk, který často likviduje hnízda nebo mláďata, nepříteli jsou i pářádky usmrčených jedinců přímo na hnízdě. Další příčinou ubývání veverčí populace je snížení potravní nabídka v důsledku zintenzivnění zemědělského hospodaření. Pro hnízdění veverky a odchovávání mladých hraje velmi důležitou roli úživnost dané oblasti. Například v centrální skalnaté oblasti chudší na potravu veverky hnízdí jen velmi zřídka. Potrava zde stačí sotva pro samotného rodiče, takže o vyvedení mláďat se v těchto místech ani nepokouší. Naopak úsporně hnízdění je zaznamenáno nejčastěji v místech s hojností potravy, jako jsou lokality poblíž polí a luk.

Na rozdíl od jiných evropských druhů nebyl veverka na tomto území nikdy zcela vyhubena. Ptačí oblast Labského pásmu hostí 15 až 20 hnízděcích párů těchto vzácných sov.

- 2452 zobrazení

Source URL: <https://www.npcs.cz/vyr-velky-bubo-bubo>