



Language Czech

Text

V¹/₂r velká¹/₂ hnězdě jednou do roka. Jeho houkání v toku lze slyšet od řnora do dubna. Pokud byla vejce krátkce po sněníce zničena, je samice schopna snést ještě další nřhradě sněku. V hnězdě se zpravidla objevují 2-3 vejce. Na vejcích sedě v³/₄dy samička, zatímco sameček ji po celou dobu krmě. Zhruba po pěti t¹/₂dnech se vyklubou mláďata, která jsou po dobu dalších řesti t¹/₂dnř krmena na hnězdě. Schopně letu jsou pak zhruba po devěti t¹/₂dnech.



Zbarvená obou pohlaví tohoto majestátného ptáka je značně proměnlivá. Základní barvy se pohybují od rezavošedé až po tmavě rezavohnědou, přičemž to jsou světlejší, tmavější horní část těla až do světlejší spodní. U oka a pod zobákem si lze všimnout bílé skvrny. Vzájemně jsou téměř pera, která tvoří ouška. Má oranžové oči, mláďata jsou šedohnědá; s matněmi vzájemněmi tmavšími skvrnami oproti rodičům. Samice je vždy větší než samec.

Jeho kořistí jsou zejména hlodavci a drobní savci. Loví však i různé ptáky až do velikosti bažanta a troufne si i na jiné dravce. S oblibou loví také ježky.

Největším nepřítelem veverky je člověk, který často likviduje hnízda nebo mláďata, největší jsou i případy usmrcení jedinců přímo na hnízdech. Další příčinou ubývání veverčí populace je snížení potravní nabídky v důsledku zintenzivnění zemědělského hospodaření. Pro hnízdní veverky a odchovány mladých hraje velmi důležitou roli úživnost dané oblasti. Například v centrální skalnaté oblasti chudší na potravu většinou hnízda jen velmi zřídka. Potrava zde stačí sotva pro samotného rodiče, takže o vyvedení mláďat se v těchto místech ani nepokouší. Naopak úspěšnější hnízdní je zaznamenáno nejčastěji v místech s hojností potravy, jako jsou lokality poblíž polí a luk.

Na rozdíl od jiných Evropy nebyl veverka na tomto území nikdy zcela vyhubena. Ptačí oblast Labské pásky hostí 15 až 20 hnízdeců pářících toto vzácné sovy.

- 2517 zobrazená

Source URL: <https://www.npcs.cz/vyr-velky-bubo-bubo>