



Language Czech

Text

V¹/₂r velká¹/₂ hnězdě jednou do roka. Jeho houkání v toku lze slyšet od řnora do dubna. Pokud byla vejce krátkce po sněníce zničena, je samice schopna snést ještě další nřhradě sněku. V hnězdě se zpravidla objevují 2-3 vejce. Na vejcích sedě v³/₄dy samička, zatímco sameček ji po celou dobu krmě. Zhruba po pěti t¹/₂dnech se vyklubou mláďata, která jsou po dobu dalších řesti t¹/₂dnř krmena na hnězdě. Schopně letu jsou pak zhruba po devěti t¹/₂dnech.



Zbarvená obou pohlaví tohoto majestátného ptáka je značně proměnlivá. Základní barvy se pohybují od rezavočerné až po tmavě rezavohnědou, přičemž to jsou světlejší, tmavější horní část těla až do světlejší spodní. U oka a pod zobákem si lze všimnout bílé skvrny. Vzájemně jsou tři pera, která tvoří ouška. Má oranžové oči, mláďata jsou lutohnědá; s matnějšími tmavšími skvrnami oproti rodičům. Samice je větší než samec.

Jeho kořistí jsou zejména hlodavci a drobní savci. Loví však i různé ptáky až do velikosti bažanta a troufne si i na jiné dravce. S oblibou loví také ježky.

Největším nepřítelem vřezky je šelma, která často likviduje hnízda nebo mláďata, nepříteli jsou i pářádky usmrčených jedinců pářámo na hnízdech. Další příčinou úhynů vřezky populace je snížení potravní nabídky v důsledku zintenzivnění zemědělského hospodaření. Pro hnízdní vřezky a odchovány mladých hraje velmi důležitou roli úživnost dané oblasti. Například v centrální skalnaté oblasti chudě na potravu vřezky hnízda jen velmi zřídka. Potrava zde stačí sotva pro samotného rodiče, takže o vyvedení mláďat se v těchto místech ani nepokouší. Naopak úsporně hnízdní je zaznamenáno nejčastěji v místech s hojnou potravou, jako jsou lokality poblíž polí a luk.

Na rozdíl od jiných šelmy Evropy nebyl vřezka na tomto území nikdy zcela vyhuben. Ptačí oblast Labské pářkovce hostí 15 až 20 hnízdních pářků toto vzácné sovy.

- 2380 zobrazená

Source URL: <https://www.npcs.cz/vyr-velky-bubo-bubo>